



Buk lesní červenolistý

Fagus sylvatica
„Atropunicea“

Čeľad

bukovitě

Tento strom roste hlavně v listnatých smíšených lesích a jeho přirozený areál výskytu zahrnuje většinu Evropy. Čistě porosty nazýváme „bučiny“. Jedná se o jednu z místních nejrozšířenějších a nejvýznamnějších dřevin. Kultivar „Atropunicea“ se oproti původnímu druhu liší tmavě vínovým zbarvením listů.

Borka

- hladká, šedá až bělošedá
- zřídka rozpukaná

Koruna

- kuželovitá
- u starších exemplářů rozložitě vyklenutá

Listy

- 3 - 12 cm dlouhé
- krátce řapíkaté, vejčité, obvejčité
- čepel zvlněná až krátce zubatá
- na líci lesklé, lysé; rub světlejší
- část listů zůstává i přes zimu

Květ

- jednopohlavné, jednodomá
- ♂ - v paždí listů na dlouze stopkatých svazečcích, převislé
- ♀ - po 2-3 v načervenalé číšce
- doba květu březen - duben

Plod

- nažka (1-3 trojhranné oříšky)
- nazývají se „bukvice“
- obklopené zdřevnatělou ostnitou číškou, rozevírají se 4 chlopněmi

